

DETECCIÓN DE PRESCRIPCIONES INADECUADAS EN ANCIANOS

Autores: Rodríguez Jiménez E¹, Cifuentes Cáceres R², García Marco D³, García Sacristan A⁴, Martínez Camacho M¹, Moya Gómez P⁴

Hospital Virgen del Valle¹, Residencia de mayores Benquerencia², Hospital Nacional de Paraplégicos³, Hospital Virgen de la Salud⁴. Toledo



OBJETIVO

Detectar prescripciones potencialmente inadecuadas (PPI) mediante criterios STOPP, y realizar intervenciones para mejorar la calidad de la prescripción en ancianos

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo, llevado a cabo en una residencia de mayores, durante un año. Revisamos el tratamiento de 105 residentes. La media de edad fue de 85 años, el 66% eran mujeres. Aplicamos los criterios STOPP para detectar PPI.

RESULTADOS



CONCLUSIONES

Los criterios STOPP son una buena herramienta para detectar PPI en personas de edad avanzada. Teniendo en cuenta estos criterios y la valoración geriátrica integral al revisar los tratamientos farmacológicos, logramos optimizar la farmacoterapia y evitar posibles reacciones adversas a los medicamentos en un grupo de población especialmente vulnerable.