

ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE UTILIZACIÓN, COSTE-EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON DARATUMUMAB EN MIELOMA MÚLTIPLE



Sánchez Rubio F, Díaz Rangel M, Aldaz Francés R, Marco del Río J, Pérez Alpuente I, Ruiz Sánchez S.
Servicio de Farmacia. Área de Gestión Integrada de Albacete

XIII Jornada Científica
Talavera de la Reina
20 y 21 Abril de 2018

OBJETIVO

Daratumumab está indicado en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con Mieloma Múltiple (MM) en recaída y refractario al tratamiento, que hayan recibido previamente un inhibidor del proteasoma (IP) y un agente inmunomodulador (IMiD) y que hayan presentado progresión de la enfermedad en el último tratamiento.

El objetivo del estudio es **analizar la utilización, eventos adversos (EA), tasa de respuesta global (TRG) y el coste del tratamiento con daratumumab en pacientes con MM.**

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo.


Se incluyeron a todos los pacientes tratados con daratumumab en la provincia de Albacete.

Variables estudiadas: sexo, edad, líneas de tratamiento previas, realización de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH), refractariedad al tratamiento, pauta posológica de daratumumab y número de administraciones, eventos adversos (EA), TRG y coste de tratamiento.

Obtención de los datos: se realizó una revisión de la historia clínica electrónica Mambrino XXI®.

Los costes se calcularon utilizando precios medios (PVL-descuento+IVA) obtenidos por el Servicio de Farmacia. Los EA se clasificaron según Common Toxicity Criteria v.4.0.

RESULTADOS



CONCLUSIONES

- ❑ La utilización de daratumumab se adecuó a las condiciones de aprobación especificadas en ficha técnica en todos los casos.
- ❑ De acuerdo con nuestros resultados, sólo un 25% de los pacientes se está beneficiando actualmente del tratamiento; y debido a su altísimo coste, es necesario seguir evaluando el fármaco en un mayor número de pacientes para confirmar su beneficio terapéutico.
- ❑ Entre los EA observados, muchos de ellos alcanzaron los grados 3-4 considerados muy graves.