

Romero Martín C¹, García Esteban B¹, Piqueras Romero C¹, Padilla Romero P², Pérez Margallo ME¹, Berrocal Javato MA¹.
Servicio de Farmacia¹. Servicio de Psiquiatría². Hospital Nuestra Señora del Prado.


Objetivos

- Describir la utilización de antipsicóticos típicos y atípicos en un centro sociosanitario adscrito al Servicio de Farmacia.
- Comprobar si las prescripciones se adecúan a las recomendaciones publicadas en las últimas guías de manejo de antipsicóticos en personas de edad avanzada para pacientes que presenten **síntomas psicológicos o conductuales de la demencia (SPCD)**.


Materiales y métodos

- Estudio descriptivo y retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes institucionalizados a Diciembre de 2017.
- **Variables registradas:** diagnóstico, antipsicótico y dosis, días de prescripción y existencia de revisión en el último año.
- **Criterios para valorar la adecuación de la prescripción:** indicación, dosis, duración del tratamiento antipsicótico tras la respuesta (recomendado 3-4 meses) y revisión tratamiento.
- **Guías utilizadas:** "Documento de la Sociedad Española de Psicogeriatría sobre el uso de antipsicóticos en personas de edad avanzada" publicado en Diciembre de 2017 y el "Protocolo para la utilización fuera de ficha técnica de Antipsicóticos de 2ª generación en SPCD" publicado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria: Farmacia-Salud Mental del SESCAM en Febrero 2018.


USO DE ANTIPSICÓTICOS



DIAGNÓSTICOS



TRATAMIENTO SPCD



Resultados

- Se incluyeron **117 pacientes** institucionalizados. El 29,1% (n=34) de los pacientes se encontraba en tratamiento con antipsicóticos: 35,3% (n=12) típicos y 64,7% (n=22) atípicos.
- La **risperidona** fue el fármaco antipsicótico más utilizado en el 41,2% (n=14).
- Para todos los fármacos las **dosis** utilizadas se ajustaron a las recomendadas.
- En todas las prescripciones de risperidona se superaron las **6 semanas** de tratamiento recomendadas en ficha técnica.
- La duración de tratamiento recomendada para SPCD fue superada en el 75% (n=15) de los pacientes. La media de duración de tratamiento fue de 15 meses.
- En el 55% (n=11) de los pacientes que presentaban SPCD no se había registrado ningún **control de su tratamiento antipsicótico** en el último año.

Conclusiones

- El uso de antipsicóticos coincide con el estimado por las guías en pacientes ancianos institucionalizados.
 - Risperidona es el **fármaco más utilizado** y el que aporta mayor evidencia de beneficio en SPCD. Es el único antipsicótico de segunda generación autorizado en España para esa indicación y en todas las prescripciones se superaron las 6 semanas de tratamiento recomendadas en ficha técnica.
 - La mitad de prescripciones en pacientes con demencia fueron "off-label".
 - Los resultados evidencian una duración de tratamiento excesiva en SPCD y una falta de seguimiento del mismo.
- Los resultados concluyen la importancia de realizar un **adecuado seguimiento farmacoterapéutico** de estos pacientes.

