


USO RACIONAL DE NUEVOS ANTIDIABETICOS

Visión de Atención Primaria

Dr. Raul Piedra Castro
Medico de Familia. Centro Salud Azuqueca de Henares




Beneficios



Costes


Situación actual

Prevalencia declarada de diabetes en la población adulta según CC.AA. Total




Situación actual

Tasa ajustada de hospitalización por diabetes mellitus por 10 000 hab. según CC.AA.
Total




Situación actual

Tasa de amputaciones miembro inferior en personas diabéticas según CC.AA. Total



Situación actual

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus, por 100 000 hab. según CC.AA. Total




Costes farmacia. Area Guadalajara (enero-agosto 2017)


GRUPO TERAPÉUTICO	PACIENTES	ENV/PACIEN TE	COSTE/PA CIENTE
AD ORALES	14183	8,84	226,31
INSULINAS	3343	6,52	363,59
ADO + INSULINA	2055	10,99	403,71

Coste total. 4.425236 €

Cambios en la prescripción de antidiabéticos. Diabetes Care




Cambios en la prescripción de antidiabéticos. AEMPS



AEMPS. Utilización de medicamentos antidiabéticos en España durante el periodo 2000-2014


Cambios en la prescripción de antidiabéticos. AEMPS




AEMPS. Utilización de medicamentos antidiabéticos en España durante el periodo 2000-2014

Y los resultados?


Hipoglucemia severa



Y los resultados?



Y los resultados?



Mata-Cases M, et al. BMJ Open 2016. Glycaemic control and antidiabetic treatment trends in primary care centres in patients with

AMENAZAS


- IMPRESIÓN SUBJETIVA DE LOS CLÍNICOS
- IMPRECISIÓN EN LOS REGISTROS
- BAJA ADHERENCIA TERAPÉUTICA
- RIESGO CARDIOVASCULAR

IMPRESIÓN SUBJETIVA

- AUMENTO DE DIAGNOSTICOS DE DIABETES TIPO-2
- MAYOR LONGEVIDAD SIN COMPLICACIONES GRAVES
- MENOR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL DIABETICA
- RETRASO EN LA INSULINIZACIÓN
- PERSISTENCIA DE ALTA PREVALENCIA DE RETINOPATIA DIABETICA Y CARDIOPATIA ISQUEMICA


IMPRECISIÓN REGISTROS

- ASIMETRIA DE PRECISIÓN.
- ALTA EN FARMACIA, ALTAS HOSPITALARIAS, ETC.
- BAJA EN ATENCIÓN PRIMARIA.



- **DATOS NO REGISTRO**
 - **HbA1C%. 9,2%**
 - **Peso. 22,7%**
 - **FG. 15,65%**

ADHERENCIA TERAPÉUTICA



OPCIONES DE MEJORA

- ¿Hipoglucemiantes o antidiabéticos?
- Planificar requiere registros de calidad
- Los protocolos y guías clínicas requieren:
 - Recursos para su aplicación
 - Evaluación de sus resultados

OPCIONES DE MEJORA

- Papel de Farmacia en AP
- No todos son fármacos.
- Cambio de modelo de educación para la salud y recomendaciones de hábitos de vida saludable.

EL CASO DE VICTOR

- PACIENTE DE 52 AÑOS DIABETICO TIPO 2 DE 10 AÑOS DE EVOLUCIÓN, OBESO, HIPERTENSO.
- TRATAMIENTO CON METFORMINA Y GLICADA 9,3
- SE AÑADE LIRAGLUTIDA
- BENEFICIOS TRAS UN AÑO DE TRATAMIENTO:
 - PERDIDA DE 16 KG PESO
 - TRATAMIENTO HIPERTENSIÓN. DE TRIPLE TERAPIA A MONOTERAPIA CON IECA
 - RETIRADA DE TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO
 - INCORPORACIÓN AL TRABAJO TRAS 5 AÑOS DESEMPLEADO